

Het resultaat

Het teveel aan huid boven de oogleden kan door een bovenooglidcorrectie goed verholpen worden. Dit zorgt voor een frissere, open blik. Over het algemeen zijn de littekens na enige maanden niet of nauwelijks meer te zien.

De kosten

In bijna alle gevallen wordt een bovenooglidcorrectie niet vergoed. Een bovenooglidcorrectie wordt alleen vergoed als er sprake is van de volgende eisen:

- Er moet sprake zijn van een functionele gezichtsveldbeperking met een verticale lidspleet (afstand tussen boven- en onderooglid) minder dan 7mm.

- Er moet sprake zijn van een situatie waarbij de onderrand van het bovenooglid of de overhangende huidplooi 1mm of meer het centrum van de pupil bedekt (meer dan 50% pupilbedekking). Dit bij recht vooruit kijken.

Onze tarieven voor een ooglidcorrectie zijn als volgt:

Bovenooglidcorrectie	€995
Onderooglidcorrectie	€2095

Contact

Plastische Chirurgie Groningen

Geulstraat 37, 9725 CH, Groningen

050 - 211 04 96

info@pcgroningen.nl

www.plastischechirurgiegroningen.nl

Ooglidcorrectie

Plastische Chirurgie

PCG

PLASTISCHE CHIRURGIE
GRONINGEN



Inleiding

De klachten die men van de bovenoogleden heeft, kan verschillen. Er zijn uiteenlopende beweegredenen om een ooglidcorrectie te ondergaan; men vindt de oogleden simpelweg niet mooi of een overschot aan huid zorgt voor een oudere, vermoeide of boze blik. Daarnaast kunnen de oogleden ook lichamelijke klachten geven, zoals hoofdpijn, een zwaar en vermoeid gevoel van de oogleden of een belemmering van het gezichtsveld.

Vorbereiding

Zelf kunt u ervoor zorgen dat u thuis zoveel mogelijk praktische zaken geregeld heeft voor een goed herstel. Denk aan de boodschappen, het huishouden en eventueel de opvang van kinderen. Een goede voorbereiding is belangrijk voor een voorspoedig herstel. Veel mensen vinden het prettig om thuis na de ingreep de ogen te koelen. Een voorbeeld van koeling is een zogeheten "coolpack". Een andere optie is het gebruik van een plastic zakje gevuld met diepvriesdoperwtjes. Koelen kan ook door middel van het nat maken van wattenschijfjes die u vervolgens in de vriezer legt. Deze kunnen daarna gebruikt worden. Het is van belang om de hierboven genoemde alternatieven nooit in directe contact met de huid te brengen, kortom verpak deze bijv. in een katoenen schone doek o.i.d.

U hoeft niet nuchter te zijn voor de operatie. Doe op de dag van de operatie geen make up en dagcrème op en verwijder eventuele contact lenzen. Na de ingreep adviseren we dringend om het vervoer naar huis uit te besteden. Zolang de hechtingen nog niet verwijderd zijn, is het af te raden zelf auto te rijden.

De operatie

Een bovenooglidcorrectie gebeurt altijd onder lokale verdoving, dit wil zeggen dat alleen de bovenoogleden worden verdoofd en er dus geen algehele narcose nodig is. Voordat er wordt geopereerd wordt uw gezicht gedesinfecteerd, waarna de rest van het hoofd wordt afgedekt. Tijdens de operatie verwijderd de plastisch chirurg het overtollige stuk huid, en haalt hij zo nodig een reepje spierweefsel en vetweefsel weg. De huid wordt dan gesloten met een niet oplosbare hechting, deze hechting wordt aan beide uiteinden vastgeplakt met een hechtpleister. Hierna mag u naar huis zodra u zich weer goed voelt. De gehele operatie duurt gemiddeld 30 à 45 minuten.



Complicaties

Een bovenooglidcorrectie is een veilige ingreep. Mogelijke complicaties zijn nabloedingen en infectie. Deze komen gelukkig weinig voor. Daarnaast kan men na de ingreep enige asymmetrie van de oogleden ervaren. De ervaring leert echter dat er voor de ingreep veelal ook al sprake was van asymmetrie maar dat dit de meeste mensen zelf niet opvalt, uiteindelijk is geen enkel persoon geheel symmetrisch.

Na de operatie

Het is normaal dat de bovenoogleden, en soms de onderoogleden, opzwellen. Dit zal in de loop der dagen vanzelf verdwijnen. Dit geldt ook voor blauwe plekken. De eerste week mag u niets doen waar u een rood hoofd van krijgt, denk aan persen, bukken, sporten of zwaar tillen. Houd er rekening mee dat het zeker de eerste week zichtbaar is dat u aan uw oogleden geopereerd bent. Het kan ook zijn dat de wonden nog wat "nabloeden". Dit kan het gevolg zijn van het uitwerken van de verdoving. Het is dan verstandig om even te gaan liggen en mogelijk te koelen. Het kan ook zijn dat de eerste dagen de wond iets kan "wijken". Dit kan komen door toename van zwelling. Wees gerust, dit komt regelmatig voor. LITTEKENCRÈME op de littekens wordt afgeraden, aangezien deze irritatie van het oog kan veroorzaken. Na het verwijderen van de hechtingen kan worden overlegd of een crème toegestaan is.

Na de operatie wordt er meteen een afspraak gemaakt voor het verwijderen van de hechtingen en een afspraak voor een controle. De afspraak voor het verwijderen van de hechtingen is meestal 5 à 7 dagen na de ingreep. Tijdens deze afspraak worden de wonden gecontroleerd en worden de hechtingen verwijderd. Ongeveer 6-8 weken na de operatie krijgt u een controleafspraak bij de plastisch chirurg.

Na de operatie heeft u meestal weinig pijn, het is meer een vervelend gevoel. Zo nodig kan u paracetamol gebruiken, 4 keer per dag 1000 mg. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen op: 050 - 211 04 96.